

DetECCIÓN TEMPRANA DE LA TARTAMUDEZ ¿CUÁNDO ES NECESARIO CONSULTAR O DERIVAR?

Factores de riesgo de Tartamudez persistente



Los factores de riesgo presentes en niños y niñas entre los 2 y 5 años, nos permitirán explicar a la familia la necesidad de una derivación temprana a una fonoaudióloga especialista en Tartamudez, para entregar sugerencias e iniciar una intervención ajustada a las necesidades de cada caso.



- Es de sexo masculino
- Existen antecedentes familiares de tartamudez
- Ha presentado disfluencias por más de 6 meses
- Parece haber empeorado su tartamudez con el tiempo
- Se presenta un retraso o trastorno del lenguaje o habla
- Se observa un temperamento sensible en el(la) niño(a)

- Repetición de palabras monosilábicas (Ej. "yo yo yo yo yo yo sé jugar")
- Repetición de sílabas iniciales de palabras (Ej. "quiero chochochochocolate")
- Repeticiones de sonidos (Ej. "¿tttttttienes mi pelota?")
- Prolongaciones de sonidos (Ej. "m___añana voy al colegio")
- Bloqueos (Ej. "me llamo /Cata")
- Tensión física al hablar (contractura de músculos de cara, cuello y/o movimientos asociados)
- Evitación de situaciones comunicativas (Ej. Susurrar al oído, evitar responder preguntas, callarse al aparecer una traba, entre otras)



Signos presentes en el habla y la comunicación



Cuando encontramos uno o más de los signos aquí señalados, a cualquier edad, es recomendable la evaluación de la fluidez del habla, por parte de una especialista.

Fuentes: Stuttering, an integrated approach to its nature and treatment (Guitar, 2014); Early Childhood Stuttering Therapy: A practical guide (Yaruss & Reardon-Reeves, 2017); www.stutteringhelp.org (Consultado en Noviembre 2020)